传染病与突发公共卫生事件
舆情信息监测

（第 36 期）

北京市疾病预防控制中心应急办公室　　2024 年 9 月 6 日

目录

一、世界卫生组织 2

1. 美洲奥罗普切热疫情 2

2.越南通报一起人感染猪源性甲型 H1N1 流感变种病毒病例 3

3. 柬埔寨报告一例人感染甲型 H5N1 禽流感病毒病例 3

二、亚洲信息 4

4.台湾急诊科和门诊的腹泻患者人数连续 5 周增加 4

5. 我国北方地区发现湿地病毒（Wetland virus，WELV） 5

6.印度马哈拉施特拉邦爆发了塞卡病毒疫情 5

三、欧洲信息 6

7.欧洲西尼罗病毒(WNV)感染传播季节已经到来 6

一、世界卫生组织

1. 美洲奥罗普切热疫情

奥罗普切热是由 Oropouche 病毒(OROV)引起的发热性疾病，主要通过一种被称为蠓的昆虫(库蠓)的叮咬传播。2024 年，世卫组织美洲区域报告的奥罗普切热病例有所增加，包括在以前没有公认的奥罗普切热病史的地区。此外，一些国家已经确定了致命感染和潜在的垂直传播。截至 2024 年 7 月 20 日，美洲区域共报告了 8078 例奥罗波切确诊病例，包括 2 例死亡，涉及玻利维亚、巴西、哥伦比亚、古巴和秘鲁 5 个国家。巴西还报告了伯南布哥州的一例胎儿死亡和一例流产，以及 4 例可能与 OROV 感染有关的小头畸形新生儿。由于奥罗普切热在美洲是一种新出现且识别不清的虫媒病毒，检测到阳性样本并确认病例需按照《国际卫生条例》的要求进行通报。奥罗普切热历来在亚马逊地区传播。然而，超越其历史范围传播的可能原因包括气候变化、森林砍伐和无计划的城市化，这些因素促进了其传播到巴西的非亚马逊州以及迄今为止尚未报告病例的国家，包括玻利维亚和古巴。根据现有信息，世卫组织评估该病毒构成的总体公共卫生风险在区域一级较高，在全球一级较低。

（https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2024-DON530）

2.越南通报一起人感染猪源性甲型 H1N1 流感变种病毒病例

2024 年 8 月 19 日，越南国际卫生条例国家归口单位(NFP)向世界卫生组织通报了一起实验室确诊的人感染猪源性甲型 H1N1 流感变种(v)病毒病例，该病例发生在越南北部山区省份松罗省，该省与老挝人民民主共和国接壤。这是越南首次报告的甲型 H1N1 流感病毒引起的人感染病例。接触该病毒的来源目前尚不清楚。根据《国际卫生条例(2005)》，由新型甲型流感病毒亚型引起的人感染是可能对公共卫生产生重大影响的事件，必须向世卫组织通报。根据目前可获得的信息，世卫组织评估该病毒目前对一般人群构成的风险较低。世卫组织继续强调全球监测的重要性，以发现与可能影响人类(或动物)健康的流行流感病毒有关的病毒学、流行病学和临床变化，并及时分享病毒以进行风险评估。

（https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2024-DON532）

3. 柬埔寨报告一例人感染甲型 H5N1 禽流感病毒病例

2024 年 8 月 20 日，世界卫生组织从该国《国际卫生条例》国家协调中心获悉，柬埔寨王国一名 15 岁儿童发生了一起经实验室确诊的人感染甲型 H5N1 禽流感病毒(分支 2.2.3.2.1 c)病例。该病例是柬埔寨 2024 年报告的 10 例甲型 H5N1 流感人间感染病例之一。从 2003 年至今，该国报告了 72 例人感染甲型 H5N1 流感病例，包括 43 例死亡(病死率为 59.7%)。根据目前可获得的信息，世卫组织评估该病毒目前对一般人群构成的风险较低。

（https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2024-DON533）

二、亚洲信息

4.台湾急诊科和门诊的腹泻患者人数连续 5 周增加

美国疾病控制与预防中心周二(2024 年 9 月 3 日)表示，截至 2024 年 8 月 31 日，台湾急诊科和门诊的腹泻患者人数连续 5 周增加，而报告的腹泻聚集性病例达到 5 年来同期的最高水平。疾控中心流行病情报中心副主任李家林在新闻发布会上说，从 2024 年 8 月 25 日至 31 日，共有 129 536 名腹泻患者就诊急诊和门诊，比前一周(2024 年 8 月 25 日那一周)增加 1.3%。这一数字高于 2019 年至 2022 年同期，但低于去年（2023）年，而且在过去五周内，总体趋势有所上升。其中大多数病例与餐馆、餐饮和食品服务以及酒店有关。在 98 例腹泻聚集性病例中，48 例病原体检测呈阳性，其中诺如病毒检测最多(29 例，占 60.4%)，其次是肠炎弧菌(14 例，占 29.2%)。

（https://focustaiwan.tw/society/202409030018）

5. 我国北方地区发现湿地病毒（Wetland virus，WELV）

2024 年 9 月 5 日，《新英格兰医学杂志》（NEJM）发表了中国军事科学院军事医学研究院、中国农业科学院长春兽医研究所合作的最新论文，详细报告了在我国北方地区，包括内蒙古自治区、黑龙江省、吉林省和辽宁省，新发现的一种 RNA 病毒——湿地病毒（Wetland virus，WELV）。

感染湿地病毒的第一例病例出现于 2019 年 6 月，一名 61 岁男性在内蒙古的一个湿地公园被蜱虫叮咬后，出现持续发热和多器官功能障碍，高通量测序显示该患者感染了一种以前未知的同源病毒，该病毒具有一个编码 L 蛋白、糖蛋白前体的单链糖蛋白前体和 N 蛋白。研究人员利用 Vero 细胞成功分离培养了该病毒，并通过 RT-PCR、间接免疫荧光、荧光原位杂交和透射电镜观察进行了确认，将其命名为湿地病毒（WELV）。进一步通过设定症状监测和蜱叮咬暴露史的条件，研究人员利用哨点医院筛查具有蜱叮咬史且症状较严重的就医患者发现了更多病例，补充了蜱传病原图谱。该病毒能够引起人类的急性感染，其临床症状包括发烧（94%）、头晕（65%）、头痛（53%）、不适（53%）、肌痛（29%）、关节炎（18%）和背痛（12%），还有 53%的患者出现胃肠道表现（恶心、呕吐和腹泻）。

（https://health.ifeng.com/c/8ceP4YinpgL）

6.印度马哈拉施特拉邦爆发了寨卡病毒疫情

《印度时报》最近报道了 113 例寨卡确诊病例，其中 100 例来自浦那地区，包括孕妇。

2024 年 8 月 22 日，美国疾病控制与预防中心发布了一份二级旅行健康通知，提供了针对寨卡病毒的具体建议。美国疾病控制与预防中心表示，所有前往马哈拉施特拉邦的旅行者都应该在旅行期间和旅行后防止蚊虫叮咬和寨卡病毒的性传播。寨卡病毒最常通过被感染的伊蚊叮咬传播给人类。

（https://www.precisionvaccinations.com/2024/08/27/zika-travel-alert-issued-regarding-indias-113-cases）

三、欧洲信息

7.欧洲西尼罗病毒(WNV)感染传播季节已经到来

截至 2024 年 7 月 31 日，欧洲 8 个国家报告了 69 例当地获得性人感染西尼罗河病毒病例。希腊(31 例)、意大利(25 例)、西班牙(5 例)、奥地利(2 例)、匈牙利(2 例)、塞尔维亚(2 例)、法国(1 例)、罗马尼亚(1 例)报告病例。希腊(5 例)、意大利(2 例)、西班牙(1 例)报告死亡 8 例。

尽管希腊和西班牙的病例数高于往年，欧洲今年迄今报告的病例总数在预期范围内，临床和严重程度指标也与前几年相似。今年受影响的所有区域要么以前受过影响，要么靠近有病例的区域。鉴于西尼罗河病毒在欧洲传播的有利天气条件，预计未来几周和几个月内还会出现更多人间病例。西尼罗河病毒通过蚊虫叮咬传播。传播在鸟类中最常见，但人类和哺乳动物也会被感染。大约 80%的人类感染没有症状。大多数人类病例发生在蚊子活跃的 7 月至 9 月之间。

（https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/west-nile-virus-season-full-swing-europe）